

STOMATOLOGIA

Ostatnio miałam zabieg usuwania ósemek. Od tego czasu prócz dużego bólu przy przełykaniu bolą mnie także migdałki. Czy to normalne?



Tomasz Sypień, lekarz medycyny, stomatolog z Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej Stomatologia Bracia Sypień

Zabieg usunięcia zębów mądrości może powodować różne dolegliwości.

Jest to zależnie, od tego, czy ósemki przed zabiegiem były widoczne w jamie ustnej, czy nie. Z powodu konieczności zastosowania znieczulenia przewodowego podczas zabiegu mogą być przez jakiś czas odczuwalne skutki samego znieczulenia, nierzadko właśnie jako ból przy przełykaniu bądź wrażenie ucisku czy rozpięcia w okolicy

gardłowej części jamy ustnej. Zupełnie inne są dolegliwości po chirurgicznym usunięciu zatrzymanych ósemek. Jeśli zabieg był przez pacjenta odczuwany jako wyjątkowo traumatyczny, może pojawić się ból o dużym nasileniu.

Dolegliwości można zmniejszyć poprzez stosowanie leków przeciwzapalnych, przeciwbólowych. Miejscowo można stosować środki ściągające – np. na bazie szalwi. Pomocne są też tabletki na gardło lub środki w sprayu stosowane przy przeziębieniu.